

Tabelle 1

Wirkstoff Einzelpräparate	Handelsname	Toxocara cati, T. Leonina Spulwurm	Uncinaria Spulwurm	Ancylostoma Hakenwurm	Trichuris Peitschen- wurm	Taenien Bandwurm	Dipylidium Gurkenkern- bandwurm	Echinococcus Fuchs- bandwurm	Gardia	Strongyloides stercoralis Zwergfaden- bandwurm	Dirofilaria immitis Herzwurm	Flöhe	Milben
Mebendazol	Mebentab	A	A	A	A	(A)			(+)				
Mebendazol	Telmin	A/(J)	A/(J)	A/(J)	A	(A)			(+)				
Fenbendazol	Panacur, Zantel	A	A	A/(J)	A	A			(+)				
Flubendazol	Flubenol	A	A	A	A	(A)				+			
Oxibendazol	Equitac	A											
Fenbantel	Rintal	(A)	(A)	(A)		A/J							
Ivermectin	Ivomec	A		A									
Selamectin	Stronghold Spot-on	A		A						+	+	+	
Milbemycinoxim	Program plus	(A)		A						+			
Pyrantel	Banminth, AntelCat	(A)	(A)	(A)	(A)								
Piperazin	Piperazincitrat	A/(J)											
Praziquantel	Droncit Spot-on					A	A	A					
Praziquantel	Droncit					A	A	A					
Epsiprantel	Banminth-Plus, Cestex					A	A	A					
Kombipräparate													
Milbemycinoxim + Praziquantel	Milbemax	A		A		A/J	A/J	A/J		+			
Praziquantel + Pyrantel	Drontal	A		A		A	A	A					
Emodepsid+Praziquantel	Profender Spot-on	A/J		A/J		A	A	A					
Praziquantel + Fenbendazol	Bihelminth	A	A	A	A	A	A	A					
Imidacloprid+Moxidectin	Advocate Spot-on	A/J		A/J						+	+	+	
Fenbendazol + Praziquantel	Caniquantel	A	A	A	A	A	A	A					
Fenbendazol + Praziquantel	Optivermin	A	A	A	A	A	A	A					

Legende:

- A - Adulte Wurmform
- J - Juvenile Wurmform
- () - bedingt wirksam (<80%)

Einige zusätzliche Info

Toxocara cati = Ascariden Katzenpulwurm sehr häufig, Zoonose möglich, Mensch ist Fehlwirt	Toxascaris leonina = Ascariden Spulwurm selten, Zoonose möglich, Mensch ist Fehlwirt	Ancylostoma Hakenwurm wichtig, Zoonose möglich	Taenia Bandwurm Mensch ist Endwirt für T.saginata
---	--	--	---

Dosierungen lt. Beipackzettel (soweit hier vorhanden)

Mebentab KH 1 Tablette=100 mg Mebendazol 22 mg/KGW (1 Tabl./4,5 kg) 3-4 Tage Tagesdosis kann auf 2 Einzelgaben aufgeteilt werden. nicht anwenden während der Trächtigkeit Gegen Spulwürmer Wiederholung nach 14 Tagen.	Milbemax (dunkelrot, teilbar) 1 Tablette = 16 mg Milbemycin-Oxim + 40 mg Praziquantel 1 Tabl./4-8 kg nicht anwenden bei Katzen, die < 2 kg wiegen	Bihelminth 1 Tablette= 50mg Praziquantel + 500mg Fenbendazol Dosierung 0,1 Tablette pro kg Katze nicht anwenden während der Trächtigkeit nicht zusammen mit Milchprodukten geben! Gabe an drei aufeinanderfolgenden Tagen	Drontal 1 Tablette = 20mg Pranziquantel + 230mg Pyrantelbolat 1 Tablette für 4 kg LG nicht anwenden während der Trächtigkeit
Panacur Tabletten 250 mg 1 Tablette = 250mg Fenbendazol 1 Tablette für 5 kg LG nicht anwenden während der Trächtigkeit nicht zusammen mit Milchprodukten geben Gabe an drei aufeinanderfolgenden Tagen	Profender Spot-on je nach Gewicht der Katze, in drei Größen erhältlich. nicht anwenden bei Kitten < 8 Wochen oder < 0,5 kg	Advocate Spot-on nach Gewicht der Katze, in zwei Größen erhältlich nicht anwenden bei Kitten < 9 Wochen oder < 1kg Für die Gabe bei geschwächten oder trächtigen Tieren lt. Hersteller keine Daten!!	